

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
АНТИ-АНГИН ФОРМУЛА

Регистрационный номер: П N015460/01 от 15.12.2008 г.

Торговое название: АНТИ-АНГИН Формула

Международное непатентованное название или группировочное название:
Хлоргексидин + Тетракаин + Аскорбиновая кислота &

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку:

Активные вещества:

Хлоргексидина диацетат.....2,00 мг

Тетракаина гидрохлорид.....0,20 мг

Аскорбиновая кислота.....50,00 мг

Вспомогательные вещества: левоментол 3,362 мг, сахарин 2,831 мг, сорбитол 1076,434 мг, кремния диоксид 5,000 мг, магния стеарат 5,750 мг, ароматизатор «анисовый» 1,415 мг, ароматизатор «мятный» 0,354 мг, краситель азорубин (Е-122) 2,654 мг.

Описание:

Таблетки плоские, со скошенным краем, от бледно-розового до красновато-розового цвета с более светлыми и более темными вкраплениями, со специфическим запахом. На обеих сторонах таблетки гравировка «NP» на фоне дерева.

Фармакотерапевтическая группа:

Антисептическое средство + местноанестезирующее средство.

Код АТХ: [R02AA20]

Фармакологическое действие:

Антибактериальное действие хлоргексидина осуществляется за счет неспецифического связывания с фосфолипидами бактериальных клеточных мембран. Хлоргексидин может оказывать бактерицидное и бактериостатическое действие, преимущественно, в отношении грамположительных бактерий и *Candida albicans*, и в меньшей мере, против грамотрицательных бактерий. Хлоргексидин особенно активен в отношении *Streptococcus mutans*, *Streptococcus salivarius*, *Escherichia coli*, *Selenomonas spp.* и анаэробных бактерий. Препарат значительно менее эффективен в отношении таких видов микроорганизмов как *Streptococcus sanguis*, *Proteus*, *Pseudomonas*, *Klebsiella veillonella*.

Анестетик тетракаин оказывает местнообезболивающее действие.

Аскорбиновая кислота является кофактором в процессе синтеза коллагена и тканевой регенерации, усиливает иммунные реакции и снижает проницаемость капилляров, тем самым, способствует уменьшению воспаления и отека слизистых оболочек полости рта и глотки.

Показания:

Профилактика и лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (стоматит, гингивит, тонзиллит, фарингит, пародонтоз, начальная стадия ангины, состояние после тонзиллэктомии или экстракции зуба и др).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 5 лет;
- I триместр беременности.

С осторожностью: во II и III триместрах беременности по назначению врача, период лактации, сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, оксалоз и почечнокаменная болезнь.

Способ применения:

Местно. Держать во рту до полного рассасывания.

Взрослые и дети с 15 лет: 6 таблеток в день с интервалом в 2 часа.

Дети с 5 до 10 лет: 3 таблетки в день с интервалом 4 часа.

Дети с 10 до 15 лет: 4 таблетки в день с интервалом 3 часа.

Побочные действия:

Аллергические реакции.

Интенсивное потребление может вызвать повреждение зубной эмали.

Передозировка:

Симптомы передозировки: головокружение, общая слабость, цианоз, возбуждение, беспокойство, мышечный тремор, нарушение дыхания, тошнота, рвота.

Лечение: промывание желудка, назначение солевых слабительных; симптоматическая терапия.

Взаимодействия:

Тетракаин снижает антибактериальную активность сульфаниламидных препаратов. Сосудосуживающие средства удлиняют эффект и уменьшают токсичность тетракаина.

Аскорбиновая кислота повышает концентрацию в крови бензилпенициллина и тетрациклинов, увеличивает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами и сульфаниламидами короткого действия, снижает концентрацию в крови пероральных контрацептивов.

Особые указания:

Не рекомендуется применять одновременно с препаратами для лечения полости рта и глотки, содержащими йод (раствор Люголя, повидон-йод). Аскорбиновая кислота, входящая в состав препарата, может изменять результаты некоторых лабораторных тестов, о чем следует сообщить при проведении анализов.

Форма выпуска:

Таблетки для рассасывания.

По 2, 4, 6, 8, 10, 12 таблеток в блистер ПВХ/Al.

По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 блистеров в картонной пачке с инструкцией по применению.

Условия хранения: при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности:

3 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель:

1. Натур Продукт Европа Б.В., Твейберг 17, 5246 XL Розмален, Нидерланды.

2. Херкель Б.В., Нобельвег 6, 3899 BN Зеевольде, Нидерланды.

По заказу и под контролем: Натур Продукт Европа Б.В., Нидерланды.

Представительство в России / Адрес организации, принимающей претензии:

ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл»

194044, Санкт-Петербург, Финляндский проспект, д. 4, литер А

Тел.: 8-800-100-03-08 (Звонок по России бесплатный).